

Ceftazidime resistente gram-negatieve bacterie?

- Kolonisatiekweken
- Eerdere infectie < 1 maand

Nee

Standard prophylaxis indien gevoelig: ciprofloxacine óf co-trimoxazol/colistine

Empirische therapie

Ceftazidime

Klinisch stabiel?

Ja

Nee

- Beleid ongewijzigd
- Indien koortsvrij 3 dagen en geen CDI/MDI: overweeg stop ceftazidime en herstart prophylaxe
- Indien persisteren koorts: verdere diagnostiek (IFD)

• Risico alfa-streptococen syndroom → DAF

Bloedkweek:
• Resistente gram – staaf
• Enterococcen
• Candida sp

➔ Pas de antimicrobiële therapie aan op geleide uitslagen

• Klinische verslechtering anderszins → diagnostiek en switch naar meropenem.

Ja

Profylaxe succesvol

Geen prophylaxe mogelijk
Profylaxe na 5 dagen geen eradicatie resistente gram - bacterie

Empirische therapie

Meropenem

Klinisch stabiel?

Ja

Nee

- Beleid ongewijzigd
- Indien 3 dagen koortsvrij en geen CDI/MDI overweeg stop AB en hervat prophylaxe
- Indien persisteren koorts: verdere diagnostiek (IFD) en overweeg versmallen naar ceftazidime

• Risico alfa-streptococen syndroom → DAF

Bloedkweek:
• Enterococcen
• Candida sp

➔ Pas de antimicrobiële therapie aan op geleide uitslagen

• Klinische verslechtering anderszins → diagnostiek

“Escalatie”

“De-escalatie”